令和６年３月　日

ぶどう栽培だより
《防除・防霜対策について》

1.病害虫防除について

園地の被覆時期・生育状況に合わせて防除を実施しましょう！

散布時期	適用病害虫	薬剤名	濃度	収穫前使用日数	総使用回数
発芽直後		**1.展着剤（ハイテンパワー）**	10,000 倍	－	－
	フタテンヒメヨコバイ	**2.アディオン水和剤**	2,000 倍	7 日前まで	5 回以内

写真.1
休眠期

写真.2
発芽直前

★農薬登録変更について★

登録内容を確認し、適正に農薬を使用しましょう。

農薬名	規格	使用について
スプラサイド水和剤	500g、667g	2024 年度の使用は不可。 （最終有効年限【2023.10】が切れているため）
ロブラール水和剤	500g	令和４年（2022 年）りんご登録失効 （隣接園への飛散に注意する）
スミチオン水和剤 40	500g 1 kg	令和８年度（2026 年）販売終了。 最終有効年度限まで使用可能。
ラビキラー乳剤	500ml	令和７年度（2025 年）販売終了。 最終有効年度限まで使用可能。
ガットサイド S	1 kg 5 kg	令和８年度（2026 年）販売終了。 最終有効年度限まで使用可能。
サイアノックス水和剤	500g 1 kg	令和７年度（2025 年）販売終了。 最終有効年度限まで使用可能。

※スプラサイド水和剤の在庫のある方は、令和６年度使用はせず適切に処分をお願いいたします。

2.防霜対策資材のご紹介

資材名及び濃度 （100L 当たり液量）		使用時期
アイスバリア	333 倍 （300ml）	休眠期・開花直前、満開期防除へ加用しましょう。 苦土・マグネシウム補給としても効果が期待されます。
グリーンステム	500 倍 （200g）	休眠期防除に加用し散布しましょう。 2 週間程度の残効が期待されます。

◇花芽が障害を受ける恐れのある温度（1 時間以上遭遇時の場合）◇

品目	休眠期	萌芽期	展葉期
ぶどう	-9.0℃	-3.0℃	-1.0℃

◆霜の降りやすい条件◆

★夜 7 時以降 6℃以下の場合★

時期	日にち
大潮	3 月 24～26 日、4 月 8～10 日、4 月 23～26 日
満月	3 月 25 日、4 月 24 日
新月	4 月 9 日

カラー版は LINE で確認いただけます。
登録は QR コードからお願いいたします。

太陽と自然の恵み

適期防除の実施で病害虫の発生を抑えましょう！
JA さがえ西村山　営農指導課