令和６年３月　　日

西洋なし栽培だより

《休眠期防除について》

1. 過去３年間の発芽状況・今年度発芽見込みについて

（山形県農業総合研究センター園芸農業研究所より）

品種	R3	R4	R5	**R6（予測）**	平年
ラ・フランス	3/23	3/27	3/19	**3/20 頃**	3/24
シルバーベル	3/23	3/28	3/16	**3/20 頃**	3/25

※今年度の発芽については JA の予測です。今後の天候と自園地の生育状況を確認しながら下記防除を実施しましょう。

2. 休眠期防除について
散布目安：３月 17～19 日頃、山手：３月 22～26 日頃

散布時期	適用病害虫	薬剤名	濃度	収穫前使用日数	総使用回数
休眠期		**1.水**			
	ハダニ類	**2.ハーベストオイル**	50 倍	発芽前	－
	越冬病害虫（胴枯病）（輪紋病）	**3.石灰硫黄合剤**	10 倍	発芽前	－

※モモシンクイガが多い園では、開花１週間前までマブリック EW(劇)2,000 倍（30 日前まで、2 回以内）を散布する。
※ハマキムシ類が多い園地では開花直前にフェニックスフロアブル 4,000 倍（前日まで、2 回以内）を散布する。

★農薬登録変更について★

登録内容を確認し、適正に農薬を使用しましょう。

農薬名	規格	使用について
スプラサイド水和剤	500g、667g	2024 年度の使用は不可。 （最終有効年限【2023.10】が切れているため）
ロブラール水和剤	500g	令和４年（2022 年）りんご登録作物失効 （隣接園への飛散に注意する）
スミチオン水和剤 40	500g 1 kg	令和８年度（2026 年）販売終了。 最終有効年度限まで使用可能。
サイアノックス水和剤	500g 1 kg	令和７年度（2025 年）販売終了。 最終有効年度限まで使用可能。

※スプラサイド水和剤の在庫のある方は、令和６年度使用はせず適切に処分をお願いいたします。

3. 防霜対策　・・・　霜による被害が心配されます。
下記資材を使用しながら対策を行いましょう!!

資材名及び濃度 （100L 当たり液量）		使用時期
霜ガード	50 倍 (2 kg)	**・正午～午後 3 時**までの気温の高い時間帯で散布を行いましょう!! ※-2℃程度の低温への効果が認められます。
アイスバリア	333 倍 （300ml）	休眠期・開花直前、満開期防除へ加用しましょう。 苦土・マグネシウム補給としても効果が期待されます。

◇花芽が障害を受ける恐れのある温度（1 時間以上遭遇時の場合）◇

品目	発芽期 （3/20～3/30 頃）	展葉期 （4/15～4/25 頃）	満開期 （4/23～4/30 頃）	落花期 （4/30～5/5 頃）
なし	－3.6℃	－2.9℃	－1.3℃	－1.3℃

◆霜の降りやすい条件◆

★夜 7 時以降 6℃以下の場合★

時期	日にち
大潮	3 月 24～26 日、4 月 8～10 日、4 月 23～26 日
満月	3 月 25 日、4 月 24 日
新月	4 月 9 日

カラー版は LINE で確認いただけます。
登録は QR コードからお願いいたします。

太陽と自然の恵み

適期防除の実施で病害虫の発生を抑えましょう！
JA さがえ西村山　営農指導課