令和６年３月　　日

すもも栽培だより

《休眠期防除について》

1. 過去３年間の発芽状況・今年度発芽見込みについて

（山形県農業総合研究センター園芸研究所）

品種	R3	R4	R5	R6（予測）	平年
大石早生	3/28	3/31	3/23	3/20 頃	3/29

※今年度の発芽については JA の予測です。今後の天候と自園地の状況を確認しながら下記防除を進めましょう。

2. 休眠期防除について
〈散布目安〉平場：３月 18 日～20 日、山手：３月 25 日～30 日

散布時期	適用病害虫	薬剤名	濃度	収穫前使用日数	総使用回数
休眠期		**1.水**			
	カイガラムシ類幼虫	**2.アプロードフロアブル**	1,000 倍	14 日前まで	２回以内
	カイガラムシ類	**3.ハーベストオイル**	50 倍	発芽前	－

※石灰硫黄合材剤を散布する場合は本防除の７日前までに実施する。

※カイガラムシは薬剤のかかっていない場所に発生します。散布量を多く丁寧に散布しましょう。

※ふくろみ病対策としてトレノックスフロアブル 500 倍（14 日前まで、３回以内）を加用してもよい。

★農薬登録変更について★

農薬名	規格	使用について
スプラサイド水和剤	500g、667g	2024 年度の使用は不可。 （最終有効年限【2023.10】が切れているため）
ロブラール水和剤	500g	令和４年（2022 年）りんご登録作物失効
ダーズバン DF	167g	最終有効年限まで使用可能

※スプラサイド水和剤の在庫のある方は、令和６年度使用はせず適切に処分をお願いいたします。

3. 若木剪定について

大石早生３年生（剪定前）



大石早生３年生（剪定後）

「大石早生」若木剪定のポイント
①角度の強い枝を間引く（誘引しても折れそうな枝）
②角度の広い枝は誘引（先端が枝元よりも低くなるように）
◆注意◆
主幹がいぼ竹の高さまで達していない若木の場合
枝の誘引を行わない⇒　下枝に養分がとられて、主幹が伸びない（右写真）。
いぼ竹の高さまで伸ばすことを第一に剪定・誘引を行いましょう

「彩李」３年生（剪定前）

「彩李」３年生（剪定後）

◆枝が重ならない程度に
　誘引
⇒花芽の着生を促す

◆枝先が枝元より
　低い位置になるように
　誘引する

◆弓上にならないように
　誘引する
⇒頂点から強い枝が
　発生するため

カラー版は LINE で確認いただけます。
登録は QR コードからお願いいたします。

太陽と自然の恵み

すももの樹の状態をよく観察して、せん定を行いましょう
JA さがえ西村山　営農指導課