

令和 7 年用ハウスメロン病害虫防除基準

発行：J A さ が え 西 村 山
さがえ西村山野菜振興協議会

※殺虫剤を散布する場合は、訪花昆虫に対する薬剤ごとの安全使用基準を徹底する。

害虫防除【殺虫剤】

作業	R A C コード	薬 剤 名	使 用 方 法				対 象 病 害 虫					注 意 事 項
			倍 率	散布量(10a)	使用時期 収穫前日数	使用回数	アブラ ムシ類	アザミ ウマ類	コナジ ラミ類	ハモグリ バエ類	ハダニ類	
定 植 時	1 B	ダイアジノン粒剤 5	4 ～ 6 kg／10a		全面土壌混和又は 作条土壌混和	は種時又は 定植時	2 回以内					●登録：ケラ、ネキリムシ類
	4 A	ベストガード粒剤	2 g／株	植穴処理土壌混和		定植時	1 回	●	ミナミ キイロ ●	●		
	4 A	ダントツ粒剤	2 g／株	植穴処理土壌混和		定植時	1 回	●	ミナミ キイロ ●	●	トマト ●	
生 育 期	4 A	ベストガード水溶剤	1, 000倍	100～300 ℓ	7 日前まで	3 回以内	●	ミナミ キイロ ●	●			
	4 A	ダントツ水溶剤	2, 000倍	100～300 ℓ	前日まで	3 回以内	●	ミナミ キイロ ●	●	●		●登録：ウリハムシ
	3 A	アディオン乳剤	2, 000倍	100～300 ℓ	前日まで	5 回以内	●					
	4 C	トランスフォームフロアブル	2, 000倍	100～300 ℓ	前日まで	3 回以内	●		●			※ミツバチ放飼期間中は使用を避ける。
	9 B	コルト顆粒水和剤	4, 000倍	100～300 ℓ	前日まで	3 回以内	●		●			
	29	ウララ D F	2, 000倍	100～300 ℓ	前日まで	2 回以内	●		●			
	1 B	マラソン乳剤	1, 000倍	100～300 ℓ	前日まで	3 回以内	●				●	●登録：ウリハムシ
	23	モベントフロアブル	2, 000倍	100～300 ℓ	前日まで	3 回以内	●	●	●		●	
	10B	バロックフロアブル	2, 000倍	100～350 ℓ	前日まで	2 回以内					●	
	20B	カネマイトフロアブル	1, 000倍	150～300 ℓ	前日まで	1 回					●	
	20D	マイトコーネフロアブル	1, 000倍	100～300 ℓ	前日まで	1 回					●	
	25A	ダニサラバフロアブル	1, 000倍	100～350 ℓ	前日まで	2 回以内					●	
	6	コロマイト水和剤	2, 000倍	100～300 ℓ	前日まで	2 回以内					●	
	33	ダニオーテフロアブル	2, 000倍	100～300 ℓ	前日まで	2 回以内					●	
	30	グレーシア乳剤	2, 000倍	100～300 ℓ	前日まで	2 回以内		●	●	●	●	●登録：ウリノメイガ、オオタバコガ、ハスモンヨトウ
	6	アフーム乳剤	2, 000倍	100～300 ℓ	前日まで	2 回以内		●	●	●		●登録：ウリノメイガ
	11A	ゼンターリ顆粒水和剤	1, 000倍	100～300 ℓ	発生初期 前日まで	—						●登録：アオムシ、オオタバコガ、ヨトウムシ

病害防除【殺菌剤】

作業	R A C コード	薬 剤 名	使 用 方 法				対 象 病 害 虫			注 意 事 項
			倍 率	散布量(10a)	使用時期 収穫前日数	使用回数	つる枯病	べと病	うどんこ病	
育 苗 期	M 3 U N	ジマンダイセン水和剤	600倍	100～300 ℓ	7 日前まで	5 回以内	●	●		●登録：斑点細菌病、炭疽病、疫病 ※育苗期：2 ～ 3 葉期頃から散布する。
	3 M 3 U N	テーク水和剤	600倍	100～300 ℓ	7 日前まで	5 回以内	●	●	●	※【E B I 剤】耐性菌出現防止のため総使用回数 2 回以内とする。 ※マンゼブを含む（テーク、ジマンダイセン）総使用回数は 5 回以内
生 育 期	M 5	ダコニール1000	700倍	100～300 ℓ	3 日前まで	5 回以内		●	●	●登録：つる枯病（1,000倍）
	M 5 40	プロボーズ顆粒水和剤	1, 000倍	100～300 ℓ	3 日前まで	5 回以内	●	●		※ T P N を含む（ダコニール、プロボーズ）総使用回数は 5 回以内 ※ダコニール剤（ダコニール、プロボーズ）を 3 回以上連用すると茎葉が硬化する ため注意する。
	M 7	ベルコート水和剤	1, 000倍	100～300 ℓ	前日まで	5 回以内	●		●	※交配 2 ～ 3 日前から交配 2 週間後までの幼果期の時期は、葉害の恐れがあるので 使用を避ける。
	21	ランマンフロアブル	1, 000倍	150～300 ℓ	前日まで	4 回以内		●		
	11	アミスター20フロアブル	2, 000倍	100～300 ℓ	前日まで	4 回以内	●	●	●	※浸透性を高める効果のある展着剤を混用すると葉害を生じる場合がある。 ※【ストロビルリン系】耐性菌出現防止のため総使用回数は 2 回以内とする。
	2	ロブラール水和剤	1, 000倍	100～300 ℓ	前日まで	4 回以内	●			●登録：菌核病
	3	スコア顆粒水和剤	2, 000倍	200～400 ℓ	前日まで	3 回以内	●		●	
	7	ネクスターフロアブル	1, 000倍	100～300 ℓ	前日まで	3 回以内	●		●	※【S D H I 剤】 耐性菌出現防止のため連用は避け、総使用回数は 2 回以内とする。
	9	フルピカフロアブル	2, 000倍	100～300 ℓ	前日まで	4 回以内			●	

くん煙法

薬 剤 名	RAC	燃 焼 法	対 象 病 害 虫	使用量の目安	時期	回数	薬 剤 名	RAC	燃 焼 法	対 象 病 害 虫	使用量の目安	時期	回数
トリフミンジェット®	3	自 燃 式	うどんこ病	400㎡当たり 50 g	前日まで	5 回以内	マブリックジェット®	3A	自 燃 式	ハダニ類	400㎡当たり 50 g	3 日前まで	2 回以内

【注意】 マブリックジェット®は眼に対して刺激性があるので煙が眼に入らないように注意し、散布後の作業にもマスクを着用する。眼に異常を感じた場合は直ちに水洗いし、眼科医の手当てを受けて下さい。