

令和7年度さくら・ビブルナム・あじさい・スモークツリー・シンフォリカルポス病害虫防除基準

発行：J A さ が え 西 村 山
さがえ西村山花き振興協会

※殺虫剤を散布する場合は、訪花昆虫に対する薬剤ごとの安全使用基準を徹底する。

さくら

防 除 時 期	対象病害虫名	RAC	防 除 方 法〔使用時期／使用回数〕				注 意 事 項															
発 芽 前 （ 3 月 下 旬 ）	カイガラムシ類		スプレーオイル 50倍 （200ml／10ℓ）〔発芽前／－〕を散布する。				積雪等により本防除ができなかった園では、融雪後から開花期までにアブロードフロアブル1,000倍（10ml／10ℓ）〔発生初期／6回以内〕を散布する。															
開 花 始 期 ～ 満 開 期 （ 4 月 下 旬 ～ 5 月 上 旬 ）	幼 果 菌 核 病	1	トップジンM水和剤	1,500倍	（6.6 g／10ℓ）〔発病初期／5回以内〕	のいずれかを 新梢伸長始期 に散布する。	1. ほ場環境の改善を図るため消雪後全面耕うんし、地表面の乾燥をはかり、10a 当たり100kgの消石灰を均一に散布する。 2. 発病の多い枝は切り取って埋めるなど処分する。また、除草を徹底するなど過湿とならないよう園地を管理する。															
		3	サンリット水和剤	2,000倍	（5 g／10ℓ）〔展葉始期～展葉期／3回以内〕																	
生 育 期 （ 5 月 中 旬 ）	ケ ム シ 類 （コスカシバ）	4A	スタークル顆粒水溶剤 2,000倍 （5 g／10ℓ）〔発生初期／5回以内〕を散布する。				1. ケムシ類の発生が多い場合は、スタークル顆粒水溶剤を使用する。 2. コスカシバの防除には、5月中旬（成虫発生初期）にスカシバコンLを10a 当たり40～100本使用する。 3. コスカシバの食入したところからヤニ（虫ふん）が出ているので見つけしだい捕殺する。															
生 育 期 （ 6 月 ～ 8 月 ）	ハ ダ ニ 類	10B	バロックフロアブル 2,000倍 （5 ml／10ℓ）〔発生初期／1回〕を散布する。																			
生 育 期 （ 6 月 中 下 旬 ）	カイガラムシ類幼虫	16	アブロードフロアブル	1,000倍	（10ml／10ℓ）〔発生初期／6回以内〕	を混用散布する。	1. 薬剤防除を行う場合は、下記の歩行幼虫発生時期を目安に実施する。 <table><tr><th colspan="3">歩 行 性 幼 虫 発 生 時 期</th></tr><tr><th>対 象 害 虫 名</th><th>第 1 世 代</th><th>第 2 世 代</th></tr><tr><td>ウメシロカイガラムシ</td><td>5月下旬頃</td><td>8月中旬頃</td></tr><tr><td>ナシマルカイガラムシ</td><td>6月中旬頃</td><td>8月中旬頃</td></tr><tr><td>カツラマルカイガラムシ</td><td>7月中旬頃</td><td>9月下旬～10月上旬</td></tr></table>	歩 行 性 幼 虫 発 生 時 期			対 象 害 虫 名	第 1 世 代	第 2 世 代	ウメシロカイガラムシ	5月下旬頃	8月中旬頃	ナシマルカイガラムシ	6月中旬頃	8月中旬頃	カツラマルカイガラムシ	7月中旬頃	9月下旬～10月上旬
	歩 行 性 幼 虫 発 生 時 期																					
対 象 害 虫 名	第 1 世 代	第 2 世 代																				
ウメシロカイガラムシ	5月下旬頃	8月中旬頃																				
ナシマルカイガラムシ	6月中旬頃	8月中旬頃																				
カツラマルカイガラムシ	7月中旬頃	9月下旬～10月上旬																				
	ケ ム シ 類	28	フェニックスフロアブル	4,000倍	（2.5ml／10ℓ）〔発生初期／2回以内〕																	
生 育 期 （ 7 月 ）	ケ ム シ 類 （コスカシバ）	4A	スタークル顆粒水溶剤 2,000倍 （5 g／10ℓ）〔発生初期／5回以内〕を散布する。																			
		3A	テルスター水和剤 1,000倍 （10 g／10ℓ）〔発生初期／6回以内〕を散布する。																			
生 育 期 （ 8 月 中 下 旬 ）	ケ ム シ 類	28	フェニックスフロアブル	4,000倍	（2.5ml／10ℓ）〔発生初期／2回以内〕	のいずれかを 散布する。	特にカツラマルカイガラムシは徹底して防除を行う。 2. 幼虫が群れをなしている時期を逃さず捕殺する。 3. アメリカシロヒトリ、モンクロシャチホコの薬剤防除をおこなう場合は、6月上旬中旬と8月上旬を目安にする。															
		3A	トレボン乳剤	4,000倍	（2.5ml／10ℓ）〔幼虫発生期／6回以内〕																	
周 年	て ん ぐ 巢 病	1	病枝切除後、切り口にトップジンMペースト原液〔病枝切除後／5回以内〕を塗布する。				切り取った病患部は適切に処理する。															

◎野その被害が多くなっているので駆除を徹底する。
除草剤使用基準

	薬 剤 名	10 a 当り薬量／散布量	使 用 時 期	使 用 方 法	使用回数	適 用 雑 草	特 性
処 茎 理 剤 葉	バスタ液剤	300～500 <i>ml</i> ／100～150 <i>ℓ</i>	雑草生育期	雑草茎葉散布	3回以内	一年生雑草	・作物に飛散しないように注意する。 ・ラウンドアップマックスロード（10 a 当たり薬量200～500 <i>ml</i> 、10 a 当たり散布量50～100 <i>ℓ</i> ）〔雑草生育期／4回以内〕を使用しても良い。

ビブルナム

防 除 時 期	対象病害虫名	RAC	防 除 方 法〔使用時期／使用回数〕			注 意 事 項
生 育 期	アザミウマ類	1B	オルトラン水和剤	1,000倍	（10 <i>g</i> ／10 <i>ℓ</i> ）〔発生初期／5回以内〕	を散布する。
	ハ ダ ニ 類	10B	バロックフロアブル	2,000倍	（5 <i>ml</i> ／10 <i>ℓ</i> ）〔発生初期／1回〕	を散布する。
	ケ ム シ 類	4A	スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	（5 <i>g</i> ／10 <i>ℓ</i> ）〔発生初期／5回以内〕	を散布する。
	アメリカシロヒトリ	1B	ダイアジノン水和剤34㊟	1,500倍	（6.6 <i>g</i> ／10 <i>ℓ</i> ）〔発生初期／4回以内〕	を散布する。
	フラーパラゾウムシ	1B	スミチオン乳剤	1,000倍	（10 <i>ml</i> ／10 <i>ℓ</i> ）〔－／6回以内〕	を散布する。
						前年発生があった園地では、芽の動く前から、株元へもていねいに散布する。

あじさい

防 除 時 期	対象病害虫名	RAC	防 除 方 法〔使用時期／使用回数〕			注 意 事 項
生 育 期	アザミウマ類	1B	オルトラン水和剤	1,000倍	（10 <i>g</i> ／10 <i>ℓ</i> ）〔発生初期／5回以内〕	を散布する。

スモークツリー

防 除 時 期	対象病害虫名	RAC	防 除 方 法〔使用時期／使用回数〕			注 意 事 項	
生 育 期	灰 色 か び 病	10.1	ゲッター水和剤	1,000倍	(10 g／10 ℓ)〔感染期～発生初期／5回以内〕	を散布する。	
	う どん こ 病	3 9	トリフミン水和剤	3,000倍	(3.3 g／10 ℓ)〔発病初期／5回以内〕	のいずれかを 散布する。	フルピカフロアブルは灰色かび病にも登録がある。
			フルピカフロアブル	2,000倍	(5 ml／10 ℓ)〔発病初期／5回以内〕		
	アザミウマ類	1B	オルトラン水和剤	1,000倍	(10 g／10 ℓ)〔発生初期／5回以内〕	を散布する。	
	ケ ム シ 類	4A	スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	(5 g／10 ℓ)〔発生初期／5回以内〕	を散布する。	

シンフォリカルポス

防 除 時 期	対象病害虫名	RAC	防 除 方 法〔使用時期／使用回数〕			注 意 事 項
生 育 期	アザミウマ類	1B	オルトラン水和剤	1,000倍	（10 <i>g</i> ／10 <i>ℓ</i> ）〔発生初期／5回以内〕	を散布する。
	アブラムシ類	1B	スミチオン乳剤	1,000倍	（10 <i>ml</i> ／10 <i>ℓ</i> ）〔－／6回以内〕	を散布する。
		3A	アディオン乳剤	8,000倍	（1.25 <i>ml</i> ／10 <i>ℓ</i> ）〔発生初期／6回以内〕	を散布する。
	カイガラムシ類幼虫	16	アブロードフロアブル	1,000倍	（10 <i>ml</i> ／10 <i>ℓ</i> ）〔発生初期／6回以内〕	を散布する。
	アメリカシロヒトリ	1B	ダイアジノン水和剤34㊟	1,500倍	（6.6 <i>g</i> ／10 <i>ℓ</i> ）〔発生初期／4回以内〕	を散布する。
	ハ ダ ニ 類	10B	バロックフロアブル	2,000倍	（5 <i>ml</i> ／10 <i>ℓ</i> ）〔発生初期／1回〕	を散布する。