

令和8年用ハウスメロン病害虫防除基準

発行：J A さがえ西村山
さがえ西村山野菜振興協議会

※殺虫剤を散布する場合は、訪花昆虫に対する薬剤ごとの安全使用基準を徹底する。

害虫防除【殺虫剤】

作業	RACコード	薬剤名	使用方法				対象病害虫					注意事項
			倍率	散布量(10a)	使用時期 収穫前日数	使用回数	アブラムシ類	アザミウマ類	コナジラミ類	ハモグリバエ類	ハダニ類	
定植時	1B	ダイアジノン粒剤5	4～6kg/10a	全面土壤混和又は作条土壤混和	は種時又は定植時	2回以内						●登録：ケラ、ネキリムシ類
	4A	ペストガード粒剤	2g/株	植穴処理土壤混和	定植時	1回	●	ミナミキイロ	●			
	4A	ダントツ粒剤	2g/株	植穴処理土壤混和	定植時	1回	●	ミナミキイロ	●	トマト		
生育期	4A	ペストガード水溶剤	1,000倍	100～300ℓ	7日前まで	3回以内	●	ミナミキイロ	●			
	4A	ダントツ水溶剤	2,000倍	100～300ℓ	前日まで	3回以内	●	ミナミキイロ	●	●		●登録：ウリハムシ
	3A	アディオン乳剤	2,000倍	100～300ℓ	前日まで	5回以内	●					
	4C	トランスフォームプロアブル	2,000倍	100～300ℓ	前日まで	3回以内	●		●			
	9B	コルト顆粒水和剤	4,000倍	100～300ℓ	前日まで	3回以内	●		●			※ミツバチ放飼期間中は使用を避ける。
	29	ウララDF	2,000倍	100～300ℓ	前日まで	2回以内	●		●			
	1B	マラソン乳剤	1,000倍	100～300ℓ	前日まで	3回以内	●			●		●登録：ウリハムシ
	23	モベントプロアブル	2,000倍	100～300ℓ	前日まで	3回以内	●	●	●		●	
	10B	パロックプロアブル	2,000倍	100～350ℓ	前日まで	2回以内					●	
	20B	カネマイドプロアブル	1,000倍	150～300ℓ	前日まで	1回					●	
	20D	マイトコーネプロアブル	1,000倍	100～300ℓ	前日まで	1回					●	
	25A	ダニサラバプロアブル	1,000倍	100～350ℓ	前日まで	2回以内					●	
	6	コロマイド水和剤	2,000倍	100～300ℓ	前日まで	2回以内					●	
	33	ダニオーテプロアブル	2,000倍	100～300ℓ	前日まで	2回以内					●	
	30	グレーシア乳剤	2,000倍	100～300ℓ	前日まで	2回以内		●	●	●	●	●登録：ウリノメイガ、オオタバコガ、ハスモンヨトウ
	6	アファーム乳剤	2,000倍	100～300ℓ	前日まで	2回以内		●	●	●		●登録：ウリノメイガ
	11A	ゼンターリ顆粒水和剤	1,000倍	100～300ℓ	発生初期前日まで	—						●登録：アオムシ、オオタバコガ、ヨトウムシ

病害防除【殺菌剤】

作業	RACコード	薬剤名	使用方法				対象病害虫			注意事項
			倍率	散布量(10a)	使用時期 収穫前日数	使用回数	つる枯病	べと病	うどんこ病	
育苗期	M3UN	ジマンダイセン水和剤	600倍	100～300ℓ	7日前まで	5回以内	●	●		●登録：斑点細菌病、炭疽病、疫病 ※育苗期：2～3葉期頃から散布する。
	3M3UN	テーク水和剤	600倍	100～300ℓ	7日前まで	5回以内	●	●	●	※【EBI剤】耐性菌出現防止のため総使用回数2回以内とする。 ※マンゼブを含む（テーク、ジマンダイセン）総使用回数は5回以内
	M5	ダコニール1000	700倍	100～300ℓ	3日前まで	5回以内		●	●	●登録：つる枯病（1,000倍）
生育期	M540	プロポーズ顆粒水和剤	1,000倍	100～300ℓ	3日前まで	5回以内	●	●		※TPNを含む（ダコニール、プロポーズ）総使用回数は5回以内 ※ダコニール剤（ダコニール、プロポーズ）を3回以上連用すると茎葉が硬化するため注意する。
	M7	ペルクート水和剤	1,000倍	100～300ℓ	前日まで	5回以内	●		●	※交配2～3日前から交配2週間後までの幼果期の時期は、葉害の恐れがあるので使用を避ける。
	21	ランマンプロアブル	1,000倍	150～300ℓ	前日まで	4回以内		●		
	11	アミスター20プロアブル	2,000倍	100～300ℓ	前日まで	4回以内	●	●	●	※浸透性を高める効果のある展着剤を混用すると葉害を生じる場合がある。 ※【ストロビルリン系】耐性菌出現防止のため総使用回数は2回以内とする。
	2	ロブラー水和剤	1,000倍	100～300ℓ	前日まで	4回以内	●			●登録：菌核病
	3	スコア顆粒水和剤	2,000倍	200～400ℓ	前日まで	3回以内	●		●	
	7	ネクスター水和剤	1,000倍	100～300ℓ	前日まで	3回以内	●		●	※【SDHI剤】 耐性菌出現防止のため連用は避け、総使用回数は2回以内とする。
	9	フルピカ水和剤	2,000倍	100～300ℓ	前日まで	4回以内			●	

くん煙法

薬剤名	RAC	燃焼法	対象病害虫	使用量の目安	時期	回数	薬剤名	RAC	燃焼法	対象病害虫	使用量の目安	時期	回数
トリフミンジェット	3	自燃式	うどんこ病	400m ² 当たり 50 g	前日まで	5回以内	マブリックジェット	3A	自燃式	ハダニ類	400m ² 当たり 50 g	3日前まで	2回以内

【注意】マブリックジェットは眼に対して刺激性があるので煙が眼に入らないように注意し、散布後の作業にもマスクを着用する。眼に異常を感じた場合は直ちに水洗いし、眼科医の手当てを受けて下さい。