



もも栽培だより



≪「あかつき」硬核期に入りました！

編≫

1.令和7年産もも硬核期について【園芸研究所:6月10日地点】

品種	年度	R5	R6	R7	平年
	調査日 (満開後日数)	6月5日 (50)	6月4日 (50)	6月10日 (51)	(50)
あかつき	1果重	22.3	29.0	32.4	31.6
	タテ	37.7	41.3	41.9	41.7
	ヨコ	32.3	35.2	36.4	36.2
	ソク	35.8	39.9	41.4	40.7
	硬核期	1.0	1.2	1.3	1.2

※硬核期は指数1で開始。指数4で終了。

「あかつき」硬核期指数は前年より6日程度遅い状況です。

硬核期終了目安は7月5日（満開後日数75日）頃の見込みです！

2.病害虫発生状況【果樹カメムシ類の飛来数が増加しています！】

表2. 果樹カメムシ類発生状況【病害虫防除所より】

年度	R7	平年
総誘殺数	23頭	3.7頭



写真1 カメムシ被害果のくぼみ症状

今年度のカメムシ類の総誘殺数は、前年より多い状況です。

園地内で成幼虫や卵、被害果を確認した場合は、速やかに捕殺や下記薬剤散布を実施しましょう！

3.病害虫防除

散布時期	適用病害虫	薬剤名	濃度	収穫前 使用日数	総使用 回数
6月中旬	せん孔細菌病	1.マイコシールド	2,000倍	21日前まで	5回以内
	灰星病 黒星病	2.トレノックスフロアブル	500倍	7日前まで	5回以内
	シンクイムシ類 モモハモグリガ (カメムシ類)	3.アグロスリン水和剤(劇)	1,000倍	前日まで	5回以内
	ハダニ類	4.ダニコングフロアブル	2,000倍	前日まで	1回

園地の生育を確認しながら、管理・防除を進めましょう。

JA さがえ西村山 営農指導課