



# もも栽培だより



《あかつき収穫開始 編》

## 1.生育状況について

### ◆果実肥大【7月31日現在】

園芸研究所「あかつき」果実肥大は前年より小さく・平年並みです。

### ◆果実内部の状況について

糖度は高く、食味は良好です。

### ◆病虫害発生状況

◎カメムシ類：果実への被害も多く、園地内でも発生が見られます。

◎シンクイムシ類：果実や新梢への被害が散見されます。

**今後の降雨により果実の軟化・落果の恐れがあります！**

**食味最優先で収穫適期の果実から収穫を進めましょう！**

## 2.病虫害防除

| 散布時期 | 適用病虫害          | 薬剤名             | 濃度      | 収穫前<br>使用日数 | 総使用<br>回数 |
|------|----------------|-----------------|---------|-------------|-----------|
| 8月中旬 | 灰 星 病<br>黒 星 病 | 1.アンビルフロアブル     | 1,000 倍 | 前日まで        | 3 回以内     |
|      | シンクイムシ類        | 2.バリアード顆粒水和剤(劇) | 2,000 倍 | 前日まで        | 3 回以内     |

| 散布時期 | 適用病虫害                        | 薬剤名            | 濃度      | 収穫前<br>使用日数 | 総使用<br>回数 |
|------|------------------------------|----------------|---------|-------------|-----------|
| 8月下旬 | 灰 星 病                        | 1.ナリア WDG      | 2,000 倍 | 前日まで        | 2 回以内     |
|      | アブラムシ類<br>シンクイムシ類<br>モモハモグリガ | 2.スカウトフロアブル(劇) | 2,000 倍 | 前日まで        | 5 回以内     |

※ハダニ類の発生している園地では、ダニオーテフロアブル 2,000 倍（前日まで、1 回）をかかりむらの内容に散布する（上記防除への混用も可）。

園地の生育を確認しながら、管理・防除を進めましょう。

JA さがえ西村山 営農指導課