


西洋なし栽培だより



《早生種収穫時期と防除》

1. 西洋なし(早生種)の収穫時期について

- 日照時間が多く、気温も高く経過しているため果実内部の進みは遅い状況です。
- 各品種下記期間内で収穫を実施しましょう！
- 果実品質調査(8/19 実施)から判定した収穫日は下記のとおりです。

収穫時期

品種名	収穫期目安	果実品質調査結果			収穫適期の目安
		調査月日	硬度(1b)	ヨード反応	
バートレット	8月27日～9月2日 (R6:8月23日～30日)	R7.8.19	20.3	4.4	満開後の日数 :120～125日 果肉硬度 :17～18ポンド
		R6.8.19	19.4	3.9	
		R5.8.17	18.8	4.3	
		R4.8.17	19.5	4.6	
		R3.8.17	22.2	4.4	
オーロラ	8月26日～9月1日 (R6:8月21日～26日)	R7.8.19	19.0	4.6	満開後の日数 :120～130日 ヨード反応:3.5 果肉硬度: 14ポンド
		R6.8.19	14.7	3.5	
		R5.8.17	18.6	4.6	
		R4.8.17	16.8	4.8	
		R3.8.17	20.2	4.3	
マルゲリット・マリーラ	9月8日～13日 (R6:9月3～7日)	R7.8.19	15.9	4.4	満開後の日数 :130日前後
		R6.8.19	13.3	4.0	
		R5.8.17	17.6	4.3	
		R4.8.17	13.9	4.1	
		R3.8.17	14.6	4.1	

※台風等の気象災害がある場合、収穫期を早める場合があります。その際は、担当者よりご連絡いたします。

2. 病害虫防除

散布時期	適用病害虫	薬剤及び濃度(水1000当たり薬量)		収穫前	総使用回数
⑭ 9月上旬	輪紋病	1、フrintフロアブル 25	2,000倍 (50ml)	前日まで	4回以内
	シンクイムシ類	2、エクシレルSE	5,000倍 (20ml)	前日まで	3回以内

散布時期	適用病害虫	薬剤及び濃度(水1000当たり薬量)		収穫前 使用日数	総使用回数
⑮ 9月中旬		1、展着剤(ハイテンパワー)	10,000倍 (10ml)		
	輪紋病	2、オキシンドー水和剤 80	1,200倍 (83g)	3日前まで	9回以内
	シンクイムシ類	3、スカウトフロアブル	2,000倍 (50ml)	前日まで	5回以内

※ フrintフロアブル 25 に替えて、ストロビードライフロアブル 2,000倍(前日まで、2回以内)を使用してもよい。

適期収穫・選果選別を徹底しましょう！

JA さがえ西村山 営農企画部 営農指導課