## なす栽培だより

令和7年10月

## 第10号

気温が低くなってきており、低温性の病害がでています。 うどんこ病・灰色かび病の

防除間隔は空きすぎていませんか???

## ○防除対策

農薬名	適用病害	希釈倍数	使用	使用	FRAC	規格	参考価格
			時期	回数	コード		(税抜き)
パレード 20	- 1° / - =	2 000 /#		3 回	7	250	7 000 FI
フロアブル	うどんこ病	2,000 倍		以内	/	mℓ	7,080円
ファンタジスタ	すすかび病 灰色かび病	2 000 /\$		3 回	4.4	500	0.160 [
顆粒水和剤	次巴グの物	2,000 倍	1177年	以内	11	g	9,160円
セイビアー	灰色かび病	1 000 /7	収穫 前日	3 回	)	500	0 F00 III
フロアブル 20	褐色斑点病	1,000 倍	まで	以内	12	mℓ	8,590円
ダイアメリット		1,000 倍	6	3 回	M7	200	2.160 ⊞
DF	うどんこ病	1,000 1亩		以内	19	g	2,160円
フルピカ	灰色かび病	2.000 位		4 回	9	250	6 110 M
フロアブル		2,000 倍		以内	9	mℓ	6,110円





## 古葉、障害果等を摘除して草勢の維持を図り終盤まで良品生産に努めましょう!!

農薬などについてご相談ください。 JA さがえ西村山 営農指導課 (86-8184)