

なす栽培だより

令和7年6月25日

第3号

1 生育状況

表 6月10日生育調査

5株平均

品種	圃場	主茎長 (cm)	茎径 (mm)	葉身長 たて (cm)	葉身長 よこ (cm)	花芽 (個/株)	マルチ (色)
くろべえ	寒河江市日田	49.0	8.2	17.6	11.0	5.2	黒
	寒河江市日田	40.8	7.8	15.6	10.2	4.6	白
	寒河江市幸生	34.0	7.3	15.2	8.0	3.6	黒
	大江町堂屋敷	46.2	8.4	18.4	10.0	5.0	黒
	大江町堂屋敷	39.4	6.9	16.4	7.8	3.0	白
	朝日町和合	36.4	8.4	15.6	9.8	3.4	黒
	西川町海味	40.0	9.4	16.2	10.4	2.8	黒
	R7平均	40.8	8.1	16.4	9.6	3.9	
	R6平均	45.2	8.6	13.7	9.0	4.1	

主茎長：第1主枝、茎径：上から20cm、葉身長（縦・横）：最大葉

※R6は6月11日調査

2 今後の管理

(1) 1番果を摘果する

- ・草丈が伸びない、茎が細い、葉が小さい等
草勢が弱い時は、1番果をとりましょう！！

(2) わき芽かき

- ・わき芽は早めに摘み取って、栄養の競合を防ぐ！



早めの収穫を！

(3) かん水

- ・少量多かん水でマルチ内の土壌水分を一定に保つように、マルチ内の土壌水分を確認しましょう。
過乾、過湿の繰り返しは土壌病害が増える原因！！

(4) 通路の雑草対策

- ・雑草は害虫の絶好の住処！早めに通路を耕耘・除草しましょう。

3 病害対策 ～湿度が高い状況！！湿度が高いと病気も広がりやすい！～ **降雨前の予防防除を徹底しましょう。**

○灰色かび病(適温 20℃前後) ○褐色腐敗病(適温 25℃～30℃)
【褐色腐敗病登録農薬】

農薬名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	R A C コード	規格	参考価格 (税抜き)
ランマンフロアブル	2,000 倍	収穫前日 まで	4 回以内	21	100 ml	1,070 円
ホライズンドライ フロアブル	2,500 倍		3 回以内	11・27	200g	3,300 円
ピシロック フロアブル	1,000 倍		3 回以内	U17	500 ml	3,680 円
レーバスフロアブル	2,000 倍		3 回以内	40	250 ml	3,180 円

☆ローテーション散布を行いましょ！

※ホライズンドライフロアブルは果実が汚れる場合がある。

4 害虫対策

定植時の粒剤効果は約 1 ヶ月程度！発生初期に防除を行いましょ！

農薬名	適用害虫	希釈 倍数	使用 時期	本剤の 使用回数	R A C コード	規格	参考価格 (税抜き)
モスピラン 顆粒水溶剤	アザミウマ類 アブラムシ類 テントウムシダマシ類	2,000 倍	収穫前日 まで	3 回 以内	4A	500g	5,790 円
スタークル 顆粒水溶剤	アザミウマ類 カメムシ類	2,000 倍		2 回 以内		500g	5,030 円
コルト顆粒水和剤	アブラムシ類 カスミカメムシ類	4,000 倍		3 回 以内	9B	500g	7,310 円
モベント フロアブル	アザミウマ類 アブラムシ類 チャノホコリダニ ハダニ類	2,000 倍		3 回 以内	23	100 ml	1,880 円
ウララ DF	アブラムシ類 ミカンキイロアザミウマ	2,000 倍		3 回 以内	29	250 g	2,220 円

※オオタバコガについても、発見したらすぐ防除を行いましょ！

疲れがたまってくる時期です。農作業安全に留意しましょ！
JA さがえ西村山 営農指導課(86-8184)