

**13日頃から高温の予報！
かん水、追肥、しっかり行い草勢維持に努めましょう！！**

- ①根を弱らせない⇒着果負担をなくす。適期に収穫しましょう。
発根促進剤の利用。
- ②光合成を維持する⇒光が十分当たるように、古葉や黄化葉は摘葉。
葉面散布。

1 生育状況

表 8月13日生育調査

5株平均

品種	圃場	主茎長 (cm)	葉身長 たて (cm)	葉身長 よこ (cm)	着果数 花芽 (個/株)	マルチ (色)
くろべえ	寒河江市日田	160.4	24.2	17.4	43.2	黒
	寒河江市日田	125.8	22.2	13.0	32.8	白
	寒河江市幸生	137.6	20.8	14.2	37.4	黒
	大江町堂屋敷	147.2	24.0	15.0	40.2	黒
	大江町堂屋敷	143.0	25.2	15.8	38.4	白
	朝日町和合	129.2	22.2	15.0	17.8	黒
	西川町海味	159.0	25.4	16.0	39.8	黒
	R7平均	143.2	23.4	15.2	35.7	
	R6平均	151.4	16.9	14.4	26.6	

主茎長：第1主枝、葉身長（縦・横）：最大葉

※R6は8月15日調査 同圃場

2 害虫対策 ～オオタバコガ急増中～

向こう 1 か月の気温も高いと予報されていることから、今後増殖や活動が活発になること見込まれます！

令和7年オオタバコガフェロモントラップ誘殺数

場所	7/30	8/6	8/13
寒河江市日田	57	60	74
寒河江市白岩	7	12	15
大江町本郷	1	2	1

