

ねぎ栽培だより

令和7年8月29日

第6号

高温・干ばつの影響で、ねぎの生育は停滞しています。

【ねぎの生育適温は20℃～25℃】

この時期に、害虫から食害を受けるとダメージが大きくなり、また病気にかかりやすくなっています。

1 最終土寄せ(止め土)時期の目安

収穫時期	最終土寄せ時期
9月中旬	収穫予定日の15～20日前
9月下旬～10月中旬	収穫予定日の20～30日前
10月下旬	収穫予定日の30～40日前
11月以降	収穫予定日の40日前

～収穫まで期間がある圃場はしっかり対策！～

① 9月中の土寄せは、涼しい朝夕に行いましょう！

最高気温は30℃超えの予報が続いています。

根傷みを避けるため、土寄せは涼しい時間帯に行いましょう。

高温乾燥が続く場合は、無理な土寄せは見合わせましょう。

② 土寄せ前、降雨前は必ず防除！

軟腐病等による腐敗症状がみられます。

発病しやすい地際部を中心に、薬液がしっかりかかるよう継続的に予防防除散布しましょう。

2 シロイチモジヨトウが増加中！



気温が高いと増殖及び活動が活発になります。

幼虫の齢期が進むにつれ防除効果が低下するため、**若齢幼虫時(みつけたらすぐ)**に散布しましょう！

農薬等についてご相談ください。

JA さがえ西村山 営農指導課(86-8184)