



りんご栽培だより

《果実肥大調査結果について 編》



1. 生育状況(果実肥大調査結果(調査日:令和7年7月30日))

品種	項目	R5	R6	R7	R5 対比	R6 対比	園芸 研究所
つがる	タテ	64.7 mm	71.5 mm	61.6 mm	95.2%	85.4%	67.9 mm
	ヨコ	72.2 mm	76.7 mm	67.7 mm	93.0%	88.2%	76.1 mm
シナノ スイート	タテ	59.2 mm	56.1 mm	54.3 mm	91.7%	96.7%	
	ヨコ	66.0 mm	62.0 mm	59.5 mm	90.1%	95.9%	
ふじ	タテ	59.2 mm	57.6 mm	50.8 mm	85.8%	88.1%	54.1 mm
	ヨコ	66.0 mm	64.5 mm	56.5 mm	85.6%	87.5%	61.0 mm

果実肥大は前年と比較し小さい状況です！

2. カメムシ類について

○8月上旬～中旬にかけて、カメムシ類の密度が高まります！

【越冬世代とふ化した幼虫世代が混在するため】

○園地内でカメムシ類の発生のみられた園地では、下記防除を実施し
果実への被害を防ぎましょう！

3. 病害虫防除

散布 時期	適用病害虫	薬剤名	濃度	収穫前 使用日数	総使用 回数
8月 中旬	斑点落葉病 褐斑病 輪紋病 炭そ病	1.ファンタジスタ顆粒水和剤	3,000 倍	前日まで	4 回以内
	シンクイムシ類	2.バリアード顆粒水和剤(劇)	2,000 倍	前日まで	3 回以内

※ビターピット対策として、ストピットⅡ500倍を加用してもよい。

※ハダニ類のみられる園地では、アカリタッチ乳剤 2,000倍を上記防除
へ加用してもよい。

散布 時期	適用病害虫	薬剤名	濃度	収穫前 使用日数	総使用 回数
8月 下旬 ～ 9月 中旬	斑点落葉病 褐斑病 輪紋病 炭そ病	1.ダイパワー水和剤	1,000 倍	前日まで	開花期 以降 3 回以内
	シンクイムシ類	2.テッパン液剤	2,000 倍	前日まで	2 回以内

農作業事故防止に向けて焦らず作業を行いましょう！

JA さがえ西村山 営農企画部 営農指導課