

つるり芋だより



第4号

令和7年8月21日

1. 生育状況

10株平均

場所	令和7年8月20日					
	葉柄長 (cm)	最大葉		生葉数 (枚)	総葉数 (枚)	腋芽数 (芽)
		たて (cm)	よこ (cm)			
西根1	48.4	34.5	28.1	6.0	10.6	2.1
西根2	86.1	47.4	39.8	5.9	6.1	0.2
平塩	91.3	50.5	40.1	5.9	6.5	0.4
谷地	57.8	41.1	29.7	5.4	6.1	0.4
岩木	80.4	49.5	39.5	5.3	40.3	17.5
令和7年度平均	72.8	44.6	35.4	5.7	13.9	4.1
令和6年度平均	84.7	47.7	34.5	4.3	7.9	2.4
過去10年間平均	78.0	46.4	34.6	4.5	7.3	4.4
前年（6年）対比	86.0%	93.5%	102.7%	132.6%	176.2%	171.7%
過去10年間対比	93.3%	96.1%	102.4%	126.7%	190.7%	93.6%



撮影日：令和7年8月20日
場所：河北町岩木



撮影日：令和7年8月20日
場所：寒河江市西根

2. かん水

芋の肥大期は積極的に畝間かん水をしましょう！

○地温の低い時間帯に、深水でかん水する。

※但し、長時間滞水しないように、量と時間を加減しましょう。

○土の表面が濡れるだけでなく、畝の中までしっかり濡れるようにかん水する。

※**通路が濡れていても、畝内が乾燥していることがあるので注意！！**

○常に畝を乾燥させないようにする。

3. 害虫対策

ハスモンヨトウ等の幼虫の寄生や食害が増加しています！今後も高温が予想されている為、増殖や活動が活発になることが見込まれます！

農薬名	適用害虫	希釈倍数	使用時期	使用回数	規格	参考価格 (税抜き)
アディオン乳剤	アブラムシ類 スズメガ類 ハスモンヨトウ	2,000 倍	収穫 7 日前 まで	5 回 以内	100 ml	1,910 円
プレオフロアブル	スズメガ類 ハスモンヨトウ	1,000 倍	収穫 7 日前 まで	2 回 以内		1,050 円
コテツフロアブル	カンザワハダニ ハスモンヨトウ	2,000 倍	収穫 7 日前 まで	2 回 以内	250 ml	4,700 円
ディアナ SC	セスジスズメ ハスモンヨトウ	2,500 倍	前日まで	2 回 以内	100 ml	3,370 円
フェニックス 顆粒水和剤	ハスモンヨトウ	2,000 倍	前日まで	2 回 以内	100 g	2,110 円

幼虫の齢期が進むにつれ防除効果が低下します。

見つけ次第速やかに散布しましょう！



農薬は使用方法を守りましょう！

JA さがえ西村山 営農指導課(86-8184)