つるり里芋だより



第5号

令和7年9月22日

1. 生育状況

7月の高温・干ばつの影響により生育が停滞し、芋の肥大も緩慢で 生育調査では S~M 品が中心となっています。気温は低くなってき たものの、平年より気温が高く、8月に比べ降雨も多くなっている ので今後も肥大すると思われます!!



撮影日:令和7年9月17日 場 所:寒河江市西根



撮影日:令和7年9月17日

場所:河北町岩木

|令和7年度つるり里芋掘り取り調査 ※平均重量3L:125g 2L:110g L:80g M:50g S:25g 2S:15g 調査日:9月16日,管内5圃場 1株当り商品外イモ数(個) 規格外 1株当り商品化イモ数(個) 場所 (個) 割合 割合 割合 品 品品 外品 2S 小計 3L 2S 小計 (%)(%)2S 小計 (%)3L 西根1 33% 50% 17% $\begin{vmatrix} 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 0.0 & 12.0 & 17.0 & 29.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 1.0 & 7.0 & 2.0 & 10.0$ 0.0 0.0 12.0 19.0 0.0 西根2 62% 13% 26% 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 1.0 5.0 39.0 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 平塩 23% 25% 52% 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 14.0 | 7.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 6.0 | 0.0 | 15.0 0.0 0.0 谷地 93.0 63% 16% 0.0 | 0.0 | 2.0 | 21.0 | 16.0 | 20.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 15.0 5.0 0.0 0.0 0.0 岩木 29% 9% 63% 35.0 13.0 | 5.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 4.0 5.0 1.0 10.0 0.0 0.0 0.0 令和7年度平均 58% 21% 21% $\begin{vmatrix} 0.0 & | 0.0 & | 1.6 & | 7.8 & | 12.6 & | 11.0 & | 33.0 & | 0.0 & | 0.0 & | 0.4 & | 4.2 & | 5.8 & | 1.6 & | 12.0 & | 0.0 & | 0.0 & | 0.0 & | 1.6 & | 3.0 & | 7.4 & | 12.0 & | 57.0 \\ \end{vmatrix}$ 令和6年度平均 54% 29% 17% 3.2 3.0 8.6 51.2 0.0 | 0.2 | 2.4 | 8.2 | 9.2 | 7.6 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 4.4 | 3.6 | 4.2 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 2.0 過去10ヵ年平均 25% 0.0 | 0.1 | 1.5 | 7.2 | 8.1 | 4.2 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.6 | 3.2 | 1.8 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 2.9 | 4.0 | 8.6 | 39.5 令和7年度階級比率 0% 5% 24% 38% 33% 3%|35%|48%|13%| 0% 0% 0% 13% 25% 62% 0%| 0%| 令和6年度階級比率 9% 30% 33% 28% 0% 19% 29% 24% 28% 5% 23% 37% 35% 過去10ヵ年階級比率 7% 34% 38% 20% 3% | 16% | 34% | 47% | 0% | 12% | 37% | 33% | 18% |

2. 害虫対策

ハスモンヨトウの被害が増加しています!虫が小さいときは 葉を食べ、大きくなると株元や芋まで食べられます。 早期発見と防除を行いましょう!!



- ○幼虫の齢期が進むにつれ防 除効果が低下します。
 - ➡若齢幼虫期に薬液が株全体 に十分付着するようにてい ねいに散布しましょう!

【登録農薬】

農薬名	適用害虫	希釈 倍数	使用時期	使用 回数	規格	参考価格 (税抜き)
フェニックス 顆粒水和剤	ハスモンヨトウ	2,000	収穫前日	2 回	500	9,980円
		倍	まで	以内	g	
プレオフロアブル	ハスモンヨトウ	1,000	収穫7日	2 回	500	5,170円
	スズメガ類	倍	前まで	以内	mℓ	
ディアナ SC	セスジスズメ	2,500	収穫前日	2 回	100	3,210円
	ハスモンヨトウ	倍	まで	以内	mℓ	

3. 収穫について

- ・掘り取り後、陰干しをしてから土砂を落とし、毛羽を必ず取り除く。 (べっとりと土がついたもの、湿気の多いものは「腐れ」、「悪臭発生」の原因)
- ・規格通りの選別を徹底し、粒を揃えるようにしましょう。

(A品とB品の混入、規格外の混入などの無いよう気をつけましょう)

今年度は 9 月 22 日(月)から出荷開始です!

農薬は使用方法を守りましょう! JA さがえ西村山 営農指導課(86-8184)