

すもも栽培だより

～「大石早生」収穫直前防除～



1.生育状況について(「果実肥大状況」について)

項目	R5	R6	R7	平年	R5 対比	R6 対比	平年 対比
1 果重 (g)	26.4	33.8	33.6	27.5	127%	99%	122%
縦径 (mm)	39.8	43.8	43.2	39.8	109%	101%	109%
横径 (mm)	35.4	39.1	39.0	36.1	110%	100%	108%
側径 (mm)	34.7	36.6	36.4	34.7	105%	99%	105%

※満開後日数 66 日で調査。

※平年値は過去 5 年間の平均値

「大石早生」着果量は、管内でばらつきがみられる状況です。

果実肥大は、前年並みで経過しています。

風づれによるさび果の発生が見られるため、選果・選別を徹底しましょう！

2.病害虫防除について

(散布目安:6月26～30日頃(大石早生収穫直前))

散布 時期	適用病害虫	薬剤名	濃度	収穫前 使用日数	総使用 回数
6月 下旬	灰 星 病	1. オーシャインフロアブル	3,000 倍	前日まで	3 回 以内
	アブラムシ類 シンクイムシ類	2. スカウトフロアブル	2,000 倍	前日まで	3 回 以内

※ハダニ類の発生が多い園では、下記殺ダニ剤のいずれかを使用する。

- ・スターマイトフロアブル 2,000 倍 (前日まで、1 回)
- ・ダニオーテフロアブル 2,000 倍 (前日まで、1 回)

～ナシヒメコン追加設置 (晩生種のある園地では設置しましょう！)～
例年ナシヒメシンクイムシ、スモモヒメシンクイの多い園地では設置
しましょう！

◇時期：6月下旬～7月上旬

◇本数：50 本/10a

農作業事故に十分注意して、管理を行いましょう！

JA さがえ西村山 営農企画部 営農指導課

