

つるむらさき栽培だより

令和7年7月22日
第3号

圃場が乾燥しています！水分が不足すると、側枝の発生が悪くなります。積極的にかん水しましょう！！

1. かん水 ～マルチ内の土壌水分がカラカラの圃場が多いです～

→土を軽く握って固まり、指で触れると崩れる程度が目安！！

- 乾燥と過湿を繰り返すような極端なかん水管理は避けましょう。
- 停滞水は根腐れを起こすので、滞水しないようにする。
- 気温の低い時間帯にかん水しましょう。

2. 収穫の留意点 ～収穫後の品温管理に注意～

【黄化やトロケ】

- 収穫は気温の低い時間帯に！
- 収穫したものは、すぐに涼しい場所へ！

出荷袋から出ていませんか？

短すぎるもの、長すぎるものは出荷できません。

出荷袋からはみ出さない高さで調整！

(クレーム発生につながる)



3. 病虫害防除

- ハウスサイドや入口は、防虫ネットで被覆する。
 - 圃場周辺を含めた除草を徹底する。
 - 残渣は圃場外へ！！
- ※農薬の使用は露地栽培のみとなっております。

4. 収穫遅れについて

- 収穫が遅れて側枝が長くなった場合→出荷規格長で収穫しない。
収穫は主枝に近い節で行い、出荷時に再調整する。
(過繁茂になって、側枝が軽い)